


BLEIKERÅSEN BOLIGSAMEIE

SKJØTSELSPLAN FOR GRØNTANLEGG OG VERDIFULL NATURTYPE I LANGENGASKOGEN

HVILKEN FREMGANGSMÅTE HVOR

- Skjøtsel av områder med verdifull naturtype
- Klippt plen
- Slått; lauveng/hagemark
- Slått; tørreng
- Slått; åpen natureng
- Randsone mot Langengaskogen
- eksisterende sti
- grense mot registrert naturtype vurdert som svært viktig iht Naturbase, Miljødirektoratet, dater 01.01.2010
- målestokk 1:1500 A1



SKJØTSEL AV VERDIFULL NATURTYPE

FREMGANGSMÅTE FOR LANGENGASKOGEN OG RANDSONE

TILTAK	FREKVENNS	NÅR									
		MARS	APRIL	MAI	JUNI	JULI	AUG	SEPT	OKT		
Fremmedarter ryddes bort; Kanadagullris og Rynkerose er registrert i området	Årlig										
Søppel og hagekompost ryddes bort	Engangstiltak/gientas ved behov										
Rydding/tynning i randsone	Engangstiltak/gientas ved behov										
Slått i randsonen	Årlig										

- HOVEDPRINSIPPER
- Edelløvtrær som eik, ask, alm, lind skal **IKKE** felles
 - Gran kan felles
 - Trær som felles skal bli liggende
 - Randsonen mot boliger skjottes som lauveng, med årlig slått
 - Hassel bevares ved rydding/tynning i randsone
 - Plantemateriale fra slått rakes bort og fjernes

SLÅTT, LAUVENG/HAGEMARK

FREMGANGSMÅTE FOR ETABLERING/SKJØTSEL AV LAUVENG

TILTAK	FREKVENNS	NÅR									
		MARS	APRIL	MAI	JUNI	JULI	AUG	SEPT	OKT		
Rydding/tynning/småplanering/stubbefjerning	Engangstiltak/gientas ved behov										
Fremmedarter ryddes bort; Kanadagullris og rynkerose er registrert i området	Årlig										
Søppel og hagekompost ryddes bort	Engangstiltak/gientas ved behov										
Slått	De første 3-4 sesongene i juni og august, deretter en gang årlig i august										
Beskjæring/oppstamping av trær	Årlig/ved behov										

- HOVEDPRINSIPPER
- Tynning/rydding av busksjikt og mindre trær for å oppnå åpen lauveng med enkelte fristilte trær og mindre treklynger
 - Rydding med påfølgende slått gjennomføres i småområder som etterhvert forbindes slik at hele området blir skjottet.
 - Store edellauvtrær og hassel bevares ved rydding/tynning
 - Rydding/slått i områder med mye nitrofile ugras utføres annenhver uke de første 3-4 sesongene
 - Plantemateriale fra slått rakes bort og fjernes
 - Arealene må ikke gjødsles

KLIPT PLEN

VEDLIEHOLD AV PLENAREALER

TILTAK	FREKVENNS	NÅR									
		MARS	APRIL	MAI	JUNI	JULI	AUG	SEPT	OKT		
Plen klippes	Ved behov										
Søppel og hagekompost ryddes bort	Engangstiltak/gientas ved behov										

- HOVEDPRINSIPPER
- Plantemateriale ved plenklipping kan bli liggende

SLÅTT, TØRRENG

FREMGANGSMÅTE FOR ETABLERING/SKJØTSEL AV LAUVENG

TILTAK	FREKVENNS	NÅR									
		MARS	APRIL	MAI	JUNI	JULI	AUG	SEPT	OKT		
Rydding/tynning/småplanering/stubbefjerning	Engangstiltak/gientas ved behov										
Fremmedarter ryddes bort; Kanadagullris og rynkerose er registrert i området	Årlig										
Søppel og hagekompost ryddes bort	Engangstiltak/gientas ved behov										
Slått	To ganger i året (ofte de 3-4 første sesongene)										
Beskjæring/oppstamping av trær	Årlig/ved behov										

- HOVEDPRINSIPPER
- Rydding/slått for å oppnå tørreng med enkelte fristilte trær.
 - Rydding/slått i områder med mye nitrofile ugras utføres annenhver uke de første 3-4 sesongene
 - Plantemateriale fra slått rakes bort og fjernes
 - Klipping vurderes ut fra om flekken begynner å se rufsete ut
 - Frekvens reduseres til to ganger i året når tørrenga har etablert seg
 - Arealene må ikke gjødsles

SLÅTT, ÅPEN NATURENG

FREMGANGSMÅTE FOR ETABLERING/SKJØTSEL AV ÅPEN NATURENG

TILTAK	FREKVENNS	NÅR									
		MARS	APRIL	MAI	JUNI	JULI	AUG	SEPT	OKT		
Rydding/småplanering/stubbefjerning	Engangstiltak/gientas ved behov										
Fremmedarter ryddes bort; Kanadagullris og Rynkerose er registrert i området	Årlig										
Søppel og hagekompost ryddes bort	Engangstiltak/gientas ved behov										
Slått	Årlig (To ganger i året de første 3-4 sesongene)										

- HOVEDPRINSIPPER
- Ingen busksjikt og ingen trær
 - Småplanering og stubbefjerning for å tilrettelegge for slåtteredskaper
 - Rydding/slått i områder med mye nitrofile ugras utføres annenhver uke de første 3-4 sesongene
 - Plantemateriale fra slått rakes bort og fjernes
 - Arealene må ikke gjødsles

REGISTRERTE ARTER SOM ER SVARTELISTET

- Bulkemispel (*Cotoneaster bullatus*)
- Blankmispel (*Cotoneaster lucidus*)
- Sprikemispel (*Cotoneaster divaricatus*)
- Krypmisspel (*Cotoneaster horizontalis*)
- Høstberberis (*Berberis thunbergii*)
- Kanadagullris (*Solidago canadensis*)
- Platanlønn (*Acer pseudoplatanus*)
- Russekål (*Bunias orientalis*)
- Rynkerose (*Rosa rugosa*)
- Skogskjegg (*Aruncus dioicus*)
- Fagerfredløs (*Lysimachia punctata*)

For nærmere informasjon om identifisering og bekjempelse se skjøtelsesplanen s. 14.

ANBEFALING - OPPFØLGING OG REVISJONER

Skjøtelsesplaner er dynamiske arbeidsgrunnlag som trenger stadig revidering. Dette fordi det er vanskelig å forutse hvordan vegetasjonen utvikler seg. Anbefalinger og tiltak bør derfor justeres etterhvert som anlegget etablerer seg. I tillegg er Svartelista og Rødlista i stadig endring, noe som påvirker håndtering av fremmede og truede arter.

Vi anbefaler derfor at skjøtelsesplanen oppdateres og at det utføres årlige skjøtelsbefalinger med fagfolk.